

Gdy dziecko boli gardło



Z powodu bólu gardła dziecko niechętnie je i pije, co:



u **dzieci poniżej 1 r.ż.** jest niebezpieczne, ponieważ nawet krótka pauza w pojeniu grozi odwodnieniem.



Ważne, by dziecko dużo piło (wody, herbatki ziołowych). **Odpowiednie nawodnienie sprzyja leczeniu.**



Unikaj potraw: **kwaśnych, ostrych, gorących**, lub **twardych** ponieważ podrażniają gardło i mogą zwiększać ból. Zamiast kanapek podaj zupkę, zamiast soku letnią herbatkę ziołową.



Zwalczanie bólu jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia bezbolesne przełykanie i zmniejsza ryzyko odwodnienia. Lek przeciwbólowy podawaj systematycznie (np. Ibuprom dla dzieci Forte co 8 godzin), nie czekając aż przestanie działać.

ZAPALENIE GARDŁA

w **70%**

powodowane jest przez wirusy¹:

Zapalenie gardła wywołane przez wirusy:

nie wymaga stosowania antybiotyków

leczenie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne wystarcza

brak gorączki lub gorączka do 38 stopni

dziecko chętnie je i pije po opanowaniu bólu gardła

Treści zawarte w niniejszym poradniku mają wyłącznie charakter informacyjny, edukacyjny oraz reklamowy i nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza. Informacje zawarte w niniejszym poradniku nie mogą zastąpić wizyty i bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Informacje zawarte w niniejszym poradniku nie mogą stanowić podstawy do samodzielnej diagnostyki i leczenia.

¹ www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-jamy-ustnej-i-gardla/179684.ostre-i-przewleklo-zapalenie-gardla

IBUPROM[®] dla Dzieci **FORTE**

w zapaleniu gardła

Mała dawka o wielkiej mocy:



**Mało płynu
do podania**



**tylko
3x dziennie**



**Potrójne działanie
(przeciwgorączkowe
+ przeciwbólowe
+ przeciwzapalne)**



**Wystarczy na długo:
120 dawek =
40 dni terapii¹**

NOWOŚĆ! 150ml



Dobierz dawkę dostosowaną do wagi Twojego dziecka:

DAWKOWANIE		Maksymalna dawka dobową Ibuprom dla dzieci Forte wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych.											
Masa ciała dziecka (kg)		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilość zawiesiny w dawce jednorazowej (ml)		1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Masa ciała dziecka (kg)		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ilość zawiesiny w dawce jednorazowej (ml)		4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6	6,25	6,5	6,75	7
Masa ciała dziecka (kg)		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ilość zawiesiny w dawce jednorazowej (ml)		7,25	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,5	9,75	10

¹ Przeliczenie dla dziecka ważącego od 5 do 7,6 kg.

Ibuprom dla dzieci Forte: ibuprofen 200 mg/5 ml, zawiesina doustna. Wskazania: gorączka różnego pochodzenia; bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej ani w połączeniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w III trymestrze ciąży i w czynnej chorobie wrzodowej przewodu pokarmowego. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.